

RAM+PTX 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
胃がん	進行再発	28 日	軽度

抗がん剤	投与量	投与日
ラムシルマブ	8 mg/kg	day 1, 15
パクリタキセル	80 mg/m ²	day 1, 8, 15

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1, 15	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 ファモチジン デキサメタゾン d-クロルフェニラミン	50 mL 20 mg 9.9 mg 5 mg	15 分
	Rp. 3 生理食塩水 ラムシルマブ	250 mL 8 mg/kg	60 分
	Rp. 4 生理食塩水	50 mL	ラインフラッシュ
	Rp. 5 5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m ²	60 分
day 8	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2 生理食塩水 ファモチジン デキサメタゾン d-クロルフェニラミン	50 mL 20 mg 9.9 mg 5 mg	15 分
	Rp. 3 5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m ²	60 分

制吐薬（内服）

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
